



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2007

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO



JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS APLICADA EM 10/05/2008

De acordo com o Edital 01/2007, que rege o Processo Seletivo Público, argumentações inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.

Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas e nem as questões que contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

RECURSOS DE GABARITOS PRELIMINARES

MÉDICO (CANCEROLOGIA/CANCEROLOGIA CLÍNICA)

Não foi interposto recurso para esse cargo.

MÉDICO (CIRURGIA PLÁSTICA)

QUESTÃO 32 – Mantida. A questão está corretamente embasada na bibliografia indicada no edital do concurso. A hipótese de se considerar a alternativa C como correta vai contra tal bibliografia.

QUESTÃO 33 – Mantida. Não há razão de anulação da questão. Ela está claramente embasada na bibliografia e é assunto/conhecimento inerente à profissão do Cirurgião.

QUESTÃO 34 – Mantida. Equivoca-se o candidato no teor do recurso. A resposta correta é a apontada pelo gabarito.

QUESTÃO 36 – Anulada. A questão apresenta erro de grafia e não está de acordo com o Edital de Abertura do certame.

QUESTÃO 39 – Anulada. A questão apresenta erro de grafia no item I, não apresentando alternativa correta.

QUESTÃO 40 – Anulada. A referida questão versa sobre *prevenção de tétano em queimados*. As alternativas sofreram ajustes, não permitindo apontar nenhuma como correta.

MÉDICO (HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA)

QUESTÃO 32 – Mantida. Os dados da literatura podem apresentar pequenas variações, mas conforme a bibliografia indicada (Zago/Falcão/Pasquini página 183) até 15% dos pacientes apresentam associação com timomas.

QUESTÃO 36 – Mantida. Embora saiba-se que o uso de corticóide possa ser uma alternativa terapêutica na situação apresentada, todas as alternativas outras que a resposta indicada estão incorretas pois mostram dados ou opções incorretas.



QUESTÃO 38 – Anulada, pois há 4 (quatro) alternativas corretas e a resposta oferecida no gabarito é a incorreta.

MÉDICO (MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE)

QUESTÃO 25 – Mantida. A posição de Trendelenburg é a primeira medida de manejo para a redução de hérnias encarceradas, segundo a bibliografia do concurso (Medicina Ambulatorial). A alternativa correta é a letra “D” tendo em vista que descreve de forma clássica a hérnia encarcerada dolorosa, segundo a bibliografia do concurso (Medicina Ambulatorial).

QUESTÃO 29 – Mantida. O edema de pés e tornozelos é uma modificação fisiológica durante a gestação e só deve ser interpretada como sinal de perigo quando acompanhado de outros sinais e sintomas, o que não ocorre com as demais alternativas da questão, que por si só são sinais de perigo.

QUESTÃO 30 – Mantida. A afirmativa III se refere à manutenção da asma moderada persistente que utiliza agonistas B2 de longa duração e não ao tratamento agudo, no qual os agonistas B2 de curta duração são utilizados, segundo as referências utilizadas no concurso (Medicina Ambulatorial baseada em evidências). Além disso não está especificado na questão nenhuma faixa etária como o candidato está referindo.

QUESTÃO 31 – Mantida. Diante do caso clínico apresentado na questão, a hipótese de contaminação inicial por HIV deve ser pensada e investigada, tendo em vista que a infecção inicial é acompanhada da sintomatologia apresentada no caso. Isto independe das respostas obtidas sobre drogas injetáveis e uso de preservativo, muitas vezes o indivíduo em um primeiro momento pode negar ou não lembrar da exposição se ela não for sistemática. Por não ser pensado, muitos diagnósticos de HIV não diagnosticados precocemente.

QUESTÃO 32 – Alterado Gabarito de B para C. A afirmativa II está errada, tendo em vista que a CAT deve ser emitida sempre que ocorrer um acidente de trabalho. As afirmativas I e III estão corretas conforme a bibliografia divulgada.

QUESTÃO 33 – Mantida. Deve-se solicitar o teste de progesterônio e a dosagem de prolactina, sendo o segundo um teste laboratorial e o primeiro a solicitação de que a paciente tome medroxiprogesterona por 7 a 10 dias. A investigação envolve exame laboratorial e não está incorreto incluir desta forma no manejo do paciente.

QUESTÃO 36 – Alterado gabarito de A para C. Estão corretas as afirmações I e III. Desta forma o gabarito correto é a letra “C”, segundo a bibliografia informada Manual de Normas de Vacinação - FUNASA - junho 2001, na página 17. A afirmativa I apresenta o calendário vacinal apresentado no mesmo manual.

QUESTÃO 39 – Mantida. Considerando a classificação proposta pela OMS e adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil, a frequência respiratória e o esforço respiratório determinam o uso ou não de antibióticos no diagnóstico clínico de infecção respiratória e não a presença ou ausência de expectoração que pode ser de origem alérgica.



MÉDICO (NEONATOLOGIA)

QUESTÃO 28 – Mantida. A questão é clara, e está embasada literalmente em *Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde*, obra indicada como bibliografia para o concurso. Não há duas respostas corretas.

QUESTÃO 32 – Mantida. 1,2 níveis subterapêuticos no pico e tóxicos no vale, além de uma menor resposta antibacteriana; 3 níveis para prematuros e 5 níveis para adultos. Puopollo KM. Bacterial and fungal infections. In Cloherthy JP, Stark AR, Einchenwald EC. Manual Care of Neonate. Lippincott, Williams & Wilkins, 5th ed, 2004:290. Avent ML et al. Gentamicin and tobramycin in neonates: comparison of a new extended dosing regimen with a traditional multiple daily dosing regimen. AmJ Perinatol 2002;8:413-19.

QUESTÃO 34 – Mantida. A) Falsa pois é sífilis congênita; B) Verdadeira: RN assintomático, títulos insignificante igual ao da mãe, mãe recebeu tratamento correto; C) Falsa, pois se considera sífilis congênita quando a mãe recebeu tratamento mesmo adequado 30 dias antes do parto; D) Falsa pois se considera sífilis congênita se a mãe recebeu tratamento qualquer que não penicilina; E) Falsa pois mãe tem títulos elevado 1:8 e o RN 1:4 e refere tratamento somente no início da gravidez, já que o títulos de VDRL desaparecem ao longo de 6 meses.

QUESTÃO 38 – Mantida. A varicela congênita que ocorre entre a 7 e 20 semanas de gravidez produzem lesões cicatriciais de pele, defeitos oculares, anormalidades do SNC, retardo de crescimento e morte fetal. Referências: Cloherthy JP in Manual of Neonatal Care; Lippincot W&W, Philadelphia, 5th ed,2004:321-326.

QUESTÃO 39 – Anulada, por deixar dubiedade na escolha de apenas uma resposta correta.

FUNDATEC
Comissão de Concursos/Processos Seletivos

Porto Alegre, 27 de maio de 2008.